

Behandlare	Namn/Patient-ID	Ålder	Kön	Datum
			Flicka Pojke	Å A M M D D

Instruktion och förklaring till formuläret

Fyll i de **vita** fälten i formuläret. Ovan fyller du i Namn/Patient-ID, Ålder, Kön och Datum.

Var vänlig och besvara alla frågor ärligt. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.

Del A. Har du under de senaste 12 månaderna:		Nej		Ja
1	druckit alkohol (mer än någon enstaka klunk)?	0 <input type="checkbox"/>	Om du svarade Nej på samtliga frågor här, besvara då endast fråga B1 nedan.	1 <input type="checkbox"/>
2	rökt marijuana eller hasch?	0 <input type="checkbox"/>		1 <input type="checkbox"/>
3	använt något annat för att bli "hög"? Här ingår bland annat illegala droger, mediciner (receptfria och receptbelagda) och sniffning.	0 <input type="checkbox"/>		1 <input type="checkbox"/>

Om du svarade **Ja** på **någon** av dessa frågor, besvara då **samtliga** frågor nedan (B1 till B6).

Del B.		Nej	Ja
1	Har det hänt att du har åkt bil då föraren var påverkad av alkohol eller droger? Räkna även med om det var du själv som körde påverkad.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
2	Har det hänt att du har använt alkohol eller droger för att koppla av, känna dig bättre till mods eller för att passa in?	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
3	Har det hänt att du har använt alkohol eller droger när du har varit ensam?	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
4	Har det hänt att du har glömt vad du har gjort när du använde alkohol eller droger?	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
5	Har det hänt att familj eller vänner har sagt till dig att du borde minska/sluta med alkohol eller droger?	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
6	Har det hänt att du har hamnat i trubbel när du använde alkohol eller droger?	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>

Sammanlagd poängsumma:

CRAFFT

Användaranvisningar för svenska versionen av CRAFFT

Screening av substansrelaterade syndrom hos barn, ungdom och unga vuxna mellan 12 och 21 år

David Öberg, Anders Tengström, Tobias Elgán, Anne Berman, Niklas Waitong, Helena Hansson och Ulla Zetterllind

CRAFFT

CRAFFT © Children's Hospital Boston, 2009.

Anvisningarna bygger på information från olika källor, bland annat information från CeASAR, The Center for Adolescent Substance Abuse Research som även stått bakom utvecklingen av CRAFFT.

Vad är CRAFFT?

CRAFFT står för Car, Relax, Alone, Forget, Friends och Trouble. Det färdigställdes 1999 för att vara ett brett screeninginstrument för att bedöma det som idag, i den svenska översättningen av DSM-5, kallas för substansrelaterade syndrom (Knight et al. 1999).

CRAFFT är utvecklat för barn och ungdom mellan 14 och 21 år men har prövats ut på barn ner till 12 års ålder (Levi et al. 2004, Knight et al. 2007).

CRAFFT är lämpligt att använda för screening av substansanvändning bland barn och ungdom i den allmänna populationen och har bland annat använts i större studier i Sverige, som en del av en större europeisk forskningsstudie (Arnaud et al. 2012, 2015), och i Norge, som en populationsstudie (Skogen et al. 2013). Det utvecklades för att identifiera barn och ungdom med risk för att utveckla missbruksproblem inom primärvården och har sedan använts inom missbruksvård, för populationsstudier etc.

CRAFFT baseras på frågor som bland annat kommer från följande formulär; Problem-Oriented Screening Test for Teenagers (POSIT), the Drug and Alcohol Problem (DAP) och Quickscreen. CRAFFT är en kortare version av det tidigare utvecklade formuläret RAFFT.

Administrering av CRAFFT

CRAFFT kan administreras som intervju eller fyllas i av patienten på egen hand. En studie (Knight et al. 2007) visade dock att ungdomar föredrog att fylla i formuläret på papper eller på dator jämfört med en personlig intervju.

Introducera CRAFFT för patienten och be den svara så ärligt som möjligt. Börja med att ställa de tre öppna initiala screeningfrågorna.

Har du under de senaste 12 månaderna:

1. druckit alkohol (mer än någon enstaka klunk)?
2. rökt marijuana eller hasch?
3. använt något annat för att bli "hög"? (I annat ingår bland annat illegala droger, mediciner [receptfria och receptbelagda] och sniffning).

Om det är ett eller flera Ja på de initiala screeningfrågorna fortsätter ni med att ställa frågorna 1 till 6 i del B.

Då patienten själv fyller i formuläret krävs en utförligare presentation där intervjuaren noga informerar om vilka frågor som fylls i och att detta baseras på det tre förskening-frågorna.

Språkversioner

CRAFFT finns översatt till 31 olika språk. På The Center for Adolescent Substance Abuse Researchs (CeASAR) hemsida finns CRAFFT att ladda ner på följande språk: engelska, kinesiska, creol (Haiti), franska, hebreiska, japanska, khmer, laotiska, ryska, portugisiska, spanska, turkiska och vietnamesiska, <http://ceasar.org/CRAFFT/screenCRAFFT.php>.

Kodning och tolkning:

Varje Ja-svar i B-delen ger 1 poäng. En grov tolkning av resultaten är följande:

1. Ingen aktuell användning (senaste 12 månaderna) av alkohol eller andra substanser samt Nej på bilfrågan (B1). Tala om att det är mycket bra och uppmuntra dem att fortsätta på samma sätt.
2. Om patienten rapporterar aktuell användning av alkohol eller andra substanser (under de senaste 12 månaderna) och har en poängsumma av 0 eller 1 ska den uppmuntras till att sluta och kan ges kort information om de hälsorisker som är förknippade med substansanvändning.
3. En poängsumma av 2 eller större anses som ett "positivt" screeningresultat och indikerar att patienten löper en hög risk för substansrelaterade syndrom (enligt DSM-5). Detta kräver i de flesta fall ytterligare utredning eller remittering till specialistvård.

Psykometriska egenskaper

En poängsumma i CRAFFT på 2 eller högre visade sig i valideringsstudien (Knight 2002) vara optimalt för att identifiera förekomsten av problem (sensitivitet, 0,76; specificitet, 0,94; positivt prediktivt värde, 0,83; och negativt prediktivt värde, 0,91), för att identifiera missbruk (sensitivitet, 0,80; specificitet, 0,86; positivt prediktivt värde, 0,53; och negativt prediktivt värde, 0,96) och beroende (sensitivitet, 0,92; specificitet, 0,80; positivt prediktivt värde, 0,25; och negativt prediktivt värde 0,99).

Den svenska valideringsstudien av Källmén med flera (2019) visade för CRAFFT en sensitivitet på 0,61 och en specificitet på 0,79. Studien kom även fram till en optimal cut-off på 2 poäng. Studiens konklusion var att CRAFFT och ASSIST-Y var att rekommendera framför tidigare använda instrument (AUDIT och DUDIT) vilka var utvecklade för vuxna.

Referenser

- Arnaud, N., Bröning, S., Drechsel, M., Thomasius, R. & Baldus, C. (2012). Web-based screening and brief intervention for poly-drug use among teenagers: study protocol of a multicentre two-arm randomized controlled trial. *BMC Public Health*. 12:826.
- Arnaud, N., Baldus, C., Elgán, T.H., Tønnesen, H., De Paepe, N., Csemy, L. & Thomasius, R. (2015). Moderators of outcome in a web-based substance use intervention for adolescents. *SUCHT*, 61, 377-387.
- Bernard, M., Bolognini, M., Plancherel, B., Chinet, L., Laget, J., Stephan, P., et al. (2005). French validity of two substance-use screening tests among adolescents: A comparison of the CRAFFT and DEP-ADO. *Journal of Substance Use*, 10(6), 385-95.
- Dhalla, S., Zumbo, B. D. & Poole, G. (2011). A review of the psychometric properties of the CRAFFT instrument: 1999–2010. *Current Drug Abuse Reviews*, 4, 57-64.
- Källmén, H., Berman, A. H., Jayram-Lindström, N., Hammarberg, A. & Elgan, T. H. (2019) Psychometric Properties of the AUDIT, AUDIT-C, CRAFFT and ASSIST-Y among Swedish Adolescents, *Eur Addict Res*, 25, 68–77.
- Knight J. R., Shrier L. A., Bravender T. D., Farrell M., Vander Bilt J. & Shaffer H. J. (1999). A new brief screen for adolescent substance abuse. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 153(6):591-6.
- Knight J. R., Sherritt L., Shrier L. A., Harris S. & K. Chang G. (2002). Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 156(6):607-14.
- Knight, J. R., Sherritt, L., Harris, S. K., Gates, E. C. & Chang, G. (2003). Validity of brief alcohol screening tests among adolescents: A comparison of the AUDIT, POSIT, CAGE, and CRAFFT. *Alcoholism, Clinical and Experimental Research*, 27(1), 67-73.
- Knight J. R., Harris S. K., Sherritt L., et al. (2007). Adolescents preference for substance abuse screening in primary care practice. *Subst Abus*. 28(4): 107-17.
- Levy S., Sherritt L., Harris S. K., et al. (2004). Test-retest reliability of adolescents self-report of substance use. *Alcohol Clin Exp Res*. 28(8): 1236-41.
- Skogen, J. C., Bøe, T., Knudsen, A. C. & Hysing, M. (2013). Psychometric properties and concurrent validity of the CRAFFT among Norwegian adolescents. *Ung@hordaland, a population-based study. Addictive Behaviors*, 38, 2500-5.