

Astma hos barn och vuxna, behandlingsrekommendation mars 2024

Tabell IX. Dygnsdoser (μg) av inhalationssteroider till barn. Se tabell VII för olika typer av inhalatorer.

Beredningsform	Substans	Låg dos	Medelhög dos	Hög dos
Barn 0–5 år				
Spray	Beklometasondipropionat	50–100	>100–200	>200
	Budesonid*	100–200	>200–400	>400
	Flutikasonpropionat**	50–100	>100–250	>250
Nebulisator (används inte inom primärvård)	Budesonid	250–500	>500–1 000	
Barn 6–11 år				
Spray	Beklometasondipropionat	50–100	>100–200	>200
	Budesonid*	100–200	>200–400	>400
	Flutikasonpropionat**	50–100	>100–250	>250
Pulver	Budesonid	100–200	>200–400	>400
	Flutikasonpropionat**	50–100	>100–250	>250
	Mometason	62,5***–100	>100–200	>200
Nebulisator (används inte inom primärvård)	Budesonid	250–500	>500–1 000	>1 000
Barn 12–18 år				
Pulver	Budesonid	200–400	>400–800	>800
	Flutikasonfuroat****	–	92	≥ 184
	Flutikasonpropionat	100–250	>250–500	>500
Spray	Mometason	62,5***–200	>200–400	>400
	Beklometason	100–200	>200–400	>400
	Budesonid*	200–400	>400–800	>800
Nebulisator (används inte inom primärvård)	Ciklesonid	80–160	>160–320	>320
	Flutikasonpropionat	100–250	>250–500	>500
	Budesonid	250–500	>500–1 000	>1 000

* Budesonid i kombination med formoterol.

** För barn under 12 år avser flutikason alltid flutikasonpropionat om inget annat anges.

*** Den lägre dosen (62,5 μg) endast i kombination med indakaterol.

**** Endast tillgänglig i fast kombination med vilanterol.

Tabell VI. Dygnsdoser för befintliga inhalationssteroider och inhalationssystem hos vuxna.
(Tabellen bygger på godkända produktresuméer och GINA 2022.)

Beredningsform	Aktiv substans	Låg dos	Medelhög dos	Hög dos
Pulver	Budesonid	200–400 μg	>400–800 μg	>800 μg
	Flutikasonfuroat*	–	92 μg	$\geq 184 \mu\text{g}$
	Flutikasonpropionat	100–250 μg	>250–500 μg	>500 μg
	Mometason	62,5**–200 μg	>200–400 μg	>400 μg
Spray	Beklometason (extrafina partiklar)	100–200 μg	200–400 μg	>400 μg
	Budesonid***	200–400 μg	>400–800 μg	>800 μg
	Flutikasonpropionat	100–250 μg	>250–500 μg	>500 μg
	Ciklesonid	80–160 μg	>160–320 μg	>320 μg

* Endast tillgänglig i fast kombination med vilanterol.

** Den lägre dosen (62,5 μg) endast i kombination med indakaterol.

*** Budesonid i kombination med formoterol i sprayform har endast KOL som godkänd indikation.